

REALVA

Catálogo de productos



Contenido



Apreciado cliente, le damos la bienvenida a nuestro catálogo de productos, en él encontrará información sobre nuestros productos y servicios, así como sobre sus aplicaciones. El compromiso de Realva es el de continuar expandiendo y reforzando su red de productos y servicios con el objetivo de apoyar a nuestros clientes en la optimización de sus procesos.

Realva

Generalidades de la empresa

3

El proveedor

Laboratorios Labipharm

4

Productos

5

Contacto

18

Catálogo de productos 2018.

Copyright 2018: No está permitida la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito. Todos los Derechos Reservados.

REALVA

Distribuidora REALVA es una empresa familiar fundada el 27 de Noviembre de 1987 por el Doctor en Medicina Veterinaria Rolando Alvarenga, y su esposa la Licenciada en Microbiología, Aida Castillo. La empresa es fundada para proveer al mercado agropecuario de Honduras con vacunas de gran calidad y con el mejor manejo de la cadena de frio.

REALVA se caracteriza por distribuir productos de gran calidad, respaldados por una empresa con un fuerte enfoque en las buenas relaciones con sus clientes y proveedores.



NUESTRA MISIÓN



Proveer a los mercados agropecuarios y veterinarios con productos, servicios y soluciones de calidad y de gran valor para la inversión de los clientes, siempre manteniendo como enfoque primordial el beneficio a la seguridad y bienestar de sus socios, clientes, proveedores y la comunidad en general.

NUESTRA VISIÓN



Ser un actor de gran valor en el mercado agropecuario y veterinario de Honduras y América Central, desarrollándose en una empresa líder a nivel regional, innovando y sirviendo en las áreas relacionadas al desarrollo y bienestar de la industria de los alimentos, los animales de compañía y la bioseguridad.

Laboratorio Labipharm



Ustio idi consequidio voloriti debis accatur
epudio qui blant earitem sint quia ventor sus
restotaestem et faces entur

Información sobre el laboratorio.

Si quatia dolupta perior si optae as miliquidic
tota deles eosserionsed eum eos alit eum et la
volum qui officil iscilicid maximinvendi dignihici-
mus. Borehenit explam iducipid etur, con reium,
sequi quiscentiis rem sitatibust, ut la que maio.
Ignit odis abor aut fugitatendes aut ommolo
quam, comnisciet dusapernam.

Contactos o generalidades

Si quatia dolupta perior si optae as miliquidic
tota deles eosserionsed eum eos alit eum et la
volum qui officil iscilicid maximinvendi dignihici-
mus. Borehenit explam iducipid etur, con reium,
sequi quiscentiis rem sitatibust, ut la que maio.
Ignit odis abor aut fugitatendes.

Productos

Dipiron 500 Inyectable

ANALGÉSICO Y ANTIINFLAMATORIO, NO ESTEROIDE.



Fórmula

Cada ml contiene:

Metamidazol sódico **500 mg**

Excipientes c.s.p **1 ml**

Descripción: Antipirético y Analgésico. Para el tratamiento sintomático de las afecciones caracterizadas por dolores agudos y fiebre. Está indicado para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, dolor tumoral y dolor espasmódico.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de las afecciones caracterizadas por dolores agudos y fiebre. Está indicado para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, dolor tumoral y dolor espasmódico.

Contraindicaciones: No utilizar conjuntamente con clorpromazina, barbitúricos y fenilbutazona.

Dosis y Administración

Bovinos y equinos	Ovinos, caprinos y porcinos	Caninos y felinos
4ml/50kg de peso	2 ml/25 kg de peso	0.5 ml/ 5 kg/ de peso

Tiempo de retiro: En carne y consumo humano 4 días después de finalizado el tratamiento.

Presentación: 30 y 100 ml.

Floxin 100 Inyectable

ENROFLOXACINA, ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO,
SOLUCIÓN INYECTABLE



Fórmula Cada ml contiene:

Enrofloxacin **100 mg**

Excipientes c.s.p. **1 ml**

Descripción: Antimicrobiano de amplio espectro. En Bovinos, Caprinos y Ovinos: Bronconeumonía, artritis, colibacilosis, salmonelosis, diarreas, vaginitis, metritis, pododermatitis, anaplasmosis y septicemias. Caninos y Felinos: Colibacilosis, salmonelosis, neumonías, metritis, septicemias, piodermatitis y abscesos.

Indicaciones: Está indicado en todas aquellas infecciones causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, micoplasmas, como: infecciones respiratorias, intestinales, del aparato genital y heridas cutáneas.

Administración y Dosis: Vía intramuscular, intravenosa, subcutánea o intrauterina.

Bovinos equinos, caninos, felinos y conejos	Porcinos, ovinos y caprinos	Aves
1 ml por cada 20 kg.	1 ml por cada 40 kg de peso vivo.	0.1ml/kg de peso vivo.

Contraindicaciones: No utilizar simultáneamente con otros medicamentos no utilizar en potros, perros menores de 1 año gatos menores de 8 meses ni animales gestantes.

Duración del tratamiento: De 3 a 5 días de acuerdo al estado del animal o según el criterio del Médico Veterinario

Periodo de retiro: Carne y huevos 7 días después de terminado en tratamiento y en leche 3 días

Presentaciones: 50, 20 y 100ml.

Floxin 100 Oral

ENROFLOXACINA, ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, SOLUCIÓN ORAL



Fórmula

Cada ml contiene:

Enrofloxacin	100 mg
Excipientes c.s.p	1 ml

Descripción: Antimicrobiano de amplio espectro en bovinos, caprinos y ovinos: Bronconeumonía, artritis, colibacilosis, salmonelosis, diarreas, vaginitis, metritis, pododermatitis, anaplasmosis y septicemias. Caninos y felinos: Colibacilosis, salmonelosis, neumonías. Aves: Coriza, infecciosa, cólera aviar, enfermedad respiratoria crónica, colibacilosis, tifoidea, paratifoidea y pullorosis.

Indicaciones: Está indicado en todas aquellas infecciones causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, micoplasmas, como: infecciones respiratorias, intestinales, del aparato genital y heridas cutáneas.

Contraindicaciones: No usar en hembras gestantes.

Administración y Dosis: Oral únicamente, 0.5 ml de Floxin 100 por cada 20 kg. De peso en agua de bebida en intervalos de 24 horas durante 3 a 5 días o según el criterio del Médico Veterinario.

Periodo de retiro: En carne 7 días, después del tratamiento.

Presentación: Gotero de 15 ml, frasco de 100ml, 500ml y litro.

Labibol 50

UNDECILINATO DE BOLDENONA ANABÓLICO DE LARGA ACCIÓN
SOLUCIÓN OLEOSA INYECTABLE.



Fórmula

Cada ml contiene:

Undecilinato de boldenona	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Indicaciones: Promotor de crecimiento, brinda una efectiva acción anabólica lo que permite un rápido aumento de peso y mejor desarrollo óseo, incremento del apetito, mejor conversión alimenticia y rápida recuperación energética. Recomendado para disminuir el estrés ocasionado por el destete, recuperación de terneros atrasados y animales débiles, así como una mejor ceba en novillos y vacas adultas de desecho.

Advertencias y precauciones: Este producto no debe utilizarse en hembras gestantes, vacas en producción de leche para consumo humano, ni en seres humanos, no se recomienda uso prolongado de anabólico en animales jóvenes. No administrar a animales con cuadros clínicos renales o hepáticos.

Dosis y Administración:

Especies	Dosis
Bovinos, equinos y porcinos	1 mL/Kg. de peso vivo
Ovinos y caprinos	0.5 mL /45 Kg. De peso vivo

Periodo de retiro en carne: para consumo humano 30 días después de finalizado el tratamiento.

Presentación: 10, 30, 50, 100 y 250ml.

Labical



Fórmula

Cada ml contiene:

Borogluconato de calcio	200 mg
Fósforo elemental	25 mg
Borogluconato de magnesio	2.0 mg
Cafeína anhidra	0.5 mg
Dextrosa	10 mg
Excipientes	1 ml

Descripción: Suplemento mineral para la prevención y tratamiento de trastornos metabólicos ocasionados por deficiencias crónicas de Calcio, Magnesio y Fosforo. Recomendado en casos de raquitismo, osteomalacia, hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia y debilidad general.

Administración: Vía intravenosa lenta y intraperitoneal.

Dosificación:

Especie	Dosis
Bovinos	500 a 750 ml
Equinos	250 a 500 ml
Ovinos	10 a 40 ml
Porcinos	50 a 100 ml
Caninos y felinos	5 a 25 ml

Presentación: frascos de 100, 250 y 500 ml.

Labifen 10%

ANTIHELMÍNTICO DE AMPLIO ESPECTRO
SUSPENSIÓN ORAL



Fórmula

Cada mL contiene:

Fenbendazol 100 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Indicaciones: Antihelmíntico de amplio espectro, seguro y eficaz para el control de los parásitos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, caprinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos. Suspensión Oral con acción efectiva para el control de huevos, larvas y parásitos adultos.

Administración y dosis: vía oral.

Especie	Dosis MK/KG	Dosis ML por peso
Bovinos	5 mg/kg de peso ostertagia inhibida 7.5 mg/kg. de peso	1 ml x 20 kg de peso. ostertagia inhibida 1.5 x 20 mg/kg. de peso
Ovinos y caprinos	5.0 mg/Kg. De peso teniasis 10 mg/kg. de peso	1 ml x 20 kg de peso. Teniasis 1 ml x 10kg. de peso
Porcinos	5.0 mg/kg. de peso	1 ml x 20 kg de peso
Equinos	7.5 mg/kg. de peso	1.5 ml x 20 kg de peso
Caninos y felinos	20 a 50 mg/kg. de peso	1 a 2 ml x 5 kg de peso

Periodo de retiro: Bovinos 14 días, ovinos 6 días. Leche 3 días.

Presentación: 100 ml, 500 ml, litro y galón.

Lavimectin 1% L.A.

ENDOPARASITICIDA Y ECTOPARASITICIDA DE LARGA ACCIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA.



Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	10 mg
Vehículo oleoso	1 ml

Descripción: Endectomicida de larga acción.

Indicaciones: Endectocida de larga Acción. Control de parásitos internos y externos en forma adulta y larvaria en Bovinos y Ovinos. Actúa contra parásitos gastrointestinales y pulmonares y es eficaz contra la mosca Dermatobia Hominis, ácaros de la sarna y garrapata en bovinos.

Administración y Dosis:

Especie	Dosis
Bovinos	1 ml/50kg de peso.
Ovinos	0.5 ml/25 kg de peso.
Porcinos	1 ml.

Periodo de retiro: En bovinos y ovinos 28 días y en porcinos 18 días después de terminado el tratamiento. No utilizar en vacas en lactancia.

Presentación: frasco de 2, 10, 30, 100, 250 y 500 ml.

Labimin Inyectable



Fórmula

Cada ml contiene:

Octadecaonata de calcio	2 mg
Glicerofosfato de sodio	5 mg
Yoruro de potasio	0.6 mg
Octadecanoato de cobre	5 mg
Octadecaonato de cobalto	5 mg
Octadecaonato de magnesio	5 mg
Octadecaonato de manganeso	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Descripción: minerales inyectables.

Indicaciones: Suplemento Mineral Inyectable para la prevención y tratamiento de trastornos metabólicos ocasionados por deficiencias crónicas de los principales minerales. Estimula el estro, el crecimiento de terneros y previene la pica o halotrofia. Reconstituyente y fortificante en animales desnutridos.

Dosis y administración: intramuscular profunda.

Especies	Dosis
Bovinos	10 ml
Equinos	5 ml
Ovinos y caprinos	3 ml
Porcinos	6 ml
Caninos y felinos	1 a 5 ml

Presentación: 100, 250, 500 ml.

Labiphos B12

FOSFORO, B12 Y SELENIO
ENERGIZANTE, RECONSTITUYENTE Y ESTIMULANTE



Fórmula

Cada ml contiene:

Glicerofosfato de sodio	200 mg
Cianocolalina	50 mcg
Selenito de sodio	300 mcg
Excipientes c. s. p.	1 ml

Indicaciones: Reconstituyente útil en estado de debilidad y agotamiento, falta de apetito, trastornos óseos como raquitismo y osteomalacia. En problemas de fertilidad, especialmente en vacas mal alimentadas

Advertencias y precauciones: En caso de repetir el tratamiento o según el criterio del médico veterinario.

Administración y Dosis: Vía intramuscular profunda, endovenosa o subcutánea.


Especie	Dosis
Bovinos y equinos	10 a 20 ml
Novillos y potros	6 a 8 ml
Porcinos	1 a 2 ml
Ovinos y caprinos	0.5 a 1 mL
Caninos y felinos	0.5 a 1 mL

Periodo de retiro en carne: en carne para consumo humano 30 días después de finalizado el tratamiento.

Presentación: frascos de 30, 50, 100, 250 y 500 ml.

LABIVIT AD3E CON COMPLEJO B

SUPLEMENTO VITAMÍNICO , SOLUCIÓN INYECTABLE



Fórmula

Cada ml contiene:

Vitamina A	20,000 UI
Vitamina D3	2,000 UI
Vitamina E	20 UI
Cianocobalamina	100 mcg
Ácido fólico	4 mg
Nicotinamida	50 mg
Tiamina	25 mg
Riboflavina	10 mg

Piridoxina	25 mg
Pantenol	10 mg
Selenito de sodio	200 mcg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Indicaciones: Solución inyectable para la prevención y tratamiento de afecciones causadas por la carencia de vitaminas A, D3 y E y Complejo B, retraso del crecimiento, raquitismo, osteomalacia, distrofias musculares, abortos, partos prematuros y retención de placenta. Coadyuvante en infertilidad, dermatitis, falta de apetito y trastornos nerviosos esencial en anemia, debilidad y estrés.

Advertencias: elevadas dosis hay riesgo de hipervitaminosis

Administración y Dosis: Vía intramuscular profunda. En ovinos vía subcutánea.

Especie	Dosis
Bovinos y equinos	5 a 10 ml
Porcinos	5 a 8 ml
Ovinos y caprinos	3 a 5 ml
Caninos y felinos	1 a 3 ml

Presentación: frascos de 10, 30, 50, 100, 250 y 500 ml.

Lavibit B-12

VITAMINA B-12 CONCENTRADA



Fórmula

Cada ml contiene:

Cianocobalina	100.0 mcg
Excipientes c.s.p	1 ml

Descripción: Reconstituyente y Tónico inespecífico que actúa directamente en la formación de glóbulos rojos, siendo eficaz en el tratamiento de las anemias perniciosas clásicas o derivadas de una mala nutrición. Estimula el apetito y es útil en el tratamiento de anemias por trabajo intenso, animal, debilitado o parasitado, manteniendo el funcionamiento del sistema nervioso en estados de tensión. Produce energía y actúa en la oxigenación muscular, retardando la fatiga prematura. Su uso está indicado en todos los animales domésticos en anemias producidas por procesos infecciosos, Moquillo, Adenitis Equina, Neumoenteritis, en animales débiles, lactantes, caballo de carrera, gallos de pelea y en general en todos aquellos casos de animales sometidos a intenso trabajo, trastornos neurológicos y convalecencias.

Indicaciones: Para el tratamiento de anemias macrocíticas. En la osteoartritis, osteoporosis, artritis y desórdenes nerviosos y gástricos. En las anemias de los caballos de carrera expuestos a trabajo intenso, debilitados o parasitados. Para el tratamiento de las anemias de las ovejas. Hematopoyético y promotor de crecimiento.

Administración y Dosis: Intravenosa o intramuscular profunda.

Bovinos y equinos	3 a 5 ml
Porcinos, ovinos y caprinos	2 a 3 ml
Caninos y felinos	1 a 2 ml

Cada 48 a 72 horas hasta completar tratamiento de 5 aplicaciones o según el criterio del médico veterinario.

Presentación: frasco 10, 30, 50 y 100ml

LABIZOLE 10% Co



Fórmula

Cada ml contiene:

Albendazole	100 mg
Cloruro de cobalto	25 mcg
Excipientes c.s.p	1 ml

Indicaciones: Desparasitante de amplio espectro con Cobalto. Seguro y eficaz para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, taenias y Fasciola Hepática en bovinos, ovinos y caprinos. Actúa sobre huevos, larvas y formas adultas.

Dosis y administración: vía oral

Peso animal Kilos	Parásitos gastroin- testinales y pulmonares	Fasciola hepática	Ostertagia tipo II
60	3 ml	6 ml	4,5 ml
120	6 ml	12 ml	9 ml
150	7,5 ml	15 ml	11,5 ml
180	9 ml	18 ml	13,5 ml
240	12 ml	24 ml	18 ml
300	15 ml	30 ml	22,5 ml

Periodo de retiro: Después de finalizado el tratamiento bovinos 14 días, ovinos y caprinos 7 días. Leche 3 días.

Presentaciones: frascos de 100 mL, 500 mL, litro y galón..

Contacto

Tegucigalpa (Sucursal Principal)

Edificio Alvarenga, Boulevard Morazán
Contiguo Paso Desnivel Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Honduras

+(504) 2236-5531

Ver Dirección en Google Maps: [Link a Proveer](#)

San Pedro Sula (Sucursal Zona Norte)

5ta Avenida Lempira (Los Leones)
Entre 10 y 11 Calle
Contiguo a la ATIC
San Pedro Sula, Cortés
+(504) 2552-9466

